

Vergleichende Untersuchungen über die
Wirkung von Casein und Reis als N-
Träger in der gemischten Nahrung auf
den Leberglykogengehalt.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des
Medizinischen Doktorgrades
an der
FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT
ZU BERLIN

vorgelegt von

FRANZ REPNOW

aus
Altdamm in Pommern.

Tag der Promotion: 20. September 1940

DRUCK: J. H. BORN, WUPPERTAL-ELBERFELD, AUE 40-44

Gedruckt mit Genehmigung
der
Medizinischen Fakultät der Universität Berlin
Dekan: Prof. Dr. Kreuz
Referent: Prof. Dr. Bickel
Korreferent: Prof. Dr. Lohmann



Im Laufe der letzten Jahre ist aus dem Bickelschen Laboratorium eine größere Reihe von Arbeiten erschienen, die sämtlich das Ziel verfolgen, neue Einblicke in das vom Eiweiß bzw. seinen Derivaten beherrschte Stoffwechselgetriebe zu eröffnen und die daraus sich ergebenden Nutzenwendungen für Volksernährung und Diätetik zu ziehen.

Durch diese Untersuchungen sollte vor allem die *Leistung des Nahrungseiweißes für den Gesamtstoffwechsel* geklärt werden und zunächst besonders die *regulatorischen Einflüsse der Resorptionsprodukte der unterschiedlichen Eiweißarten auf die Oxydationslage* im Zwischenstoffwechsel genauer fixiert werden. Methodisch bediente man sich der Ermittlung der Harnquotienten C: N und Vacat O: N unter bestimmten Versuchsvoraussetzungen, unter denen die wichtigste war, daß ein bestimmtes Eiweiß oder eine bestimmte Kombination unterschiedlicher Eiweiße, wie sie z. B. in den natürlichen Nahrungsmitteln vielfach gegeben ist, die gesamte N-Substanz im Rahmen einer definierten gemischten Nahrung darstellten.

Das Ergebnis der vergleichenden Eiweißstudien war folgendes: Nimmt man denjenigen Harnquotienten als Maßstab, der unter den geforderten Versuchsbedingungen gebildet wird, wenn Casein in bestimmter Menge das Nahrungseiweiß in der definierten gemischten Versuchsnahrung abgibt und vergleicht man damit die Wirkung der zu untersuchenden Eiweiße bzw. eiweißhaltigen Nahrungsmittel, indem man sie in N-aequimolekularer Menge gegen das Casein in der definierten Nahrung austauscht, dann findet man Eiweiße bzw. eiweißhaltige Nahrungsmittel, bei denen die Harnquotienten ungefähr die

Lage haben, wie sie beim Casein als Nahrungseiweiß beobachtet wird, oder bei denen dieser Wert höher oder niedriger liegt. (Bickel 1, Atabay 2 u. a.) Aber nicht nur bei Casein bildet sich eine niedrige Harnquotientenlage, sondern auch — wie man beim Vergleich mit anderen Eiweißen bei analoger Versuchsanordnung festgestellt hat — beim Laktalbumin, Eiereiweiß, bei der Gelatine, beim Weizenklebereiweiß (Kading 3), ferner auch bei manchen eiweißhaltigen Nahrungsmitteln, z. B. beim Fleisch oder beim Reis, wie Kohler (4) durch seine Versuche nachwies.

Die dynamischen Wirkungen der Abbauprodukte des Nahrungseiweißes offenbaren sich gewiß zunächst in der sogenannten spezifisch-dynamischen Wirkung beim Lungengaswechsel. Die dynamischen Wirkungen äußern sich ferner in Eingriffen in den Kohlehydratstoffwechsel, und zwar hier bekanntlich auch vielfach ganz unabhängig von dem zuckerbildenden Vermögen der einzelnen Aminofäuren.

Dynamische Wirkungen haben wir dann in der Dauerregulation der Verbrennungen vor uns, von der einleitend die Rede war; im Mittelpunkt steht hier die Gestaltung der Oxydationslage in Abhängigkeit von der Menge und der Qualität des Nahrungseiweißes. Außerdem liegen auch über die Abhängigkeit des Leberglykogengehaltes von der Quantität und Qualität des Nahrungseiweißes oder von Aminofäuren bereits aufschlußreiche Untersuchungen vor. Ich erinnere hier vor allem an die Versuche von Hadi Atabay, weil sie in direkter Beziehung mit meiner Arbeit stehen. Er verfütterte eine gemischte Nahrung, in der der Nahrungs-N von 25 % Reis-N und 75 % Hammelfleisch-N gebildet wurde, sowie eine zweite Nahrung mit 100 % Reis-N als Nahrungstickstoffträger. Als Versuchstiere dienten Atabay Gruppen von weißen männlichen Ratten ähnlichen Körpergewichts um 200 g. Das Resultat dieser Versuche war, daß der Leberglykogengehalt bei der Reishahrung im Mittel aller Versuche wesentlich höher lag, als bei der Nahrung mit einem Viertel Reis-N und dreiviertel Hammelfleisch-N als Nahrungstickstoff.

Wie aus der Arbeit von Kohler hervorgeht, unterhält der Reis, wenn er alleiniger Nahrungs-N-Träger ist, worauf ich schon hinwies, dieselbe niedrige Harnquotientenlage wie Casein und mithin auch eine ähnlich niedrige wie Fleisch als Nahrungs-N-Träger. Vielfach ist nun, wie aus einer Tabelle in der Schrift Bickels (1) über die Beziehungen der Qualität des Nahrungseiweißes zum Ablauf des Be-

triebsstoffwechsels hervorgeht, mit denjenigen Eiweißstoffen oder eiweißhaltigen Nahrungsmitteln, die als Nahrungseiweißträger eine niedrige Harnquotientenlage bedingen, auch ein niedriger Leberglykogengehalt und mit denjenigen, die mit einem hohen Quotientenwert verkoppelt sind, ein hoher Leberglykogengehalt verknüpft. Wenn nun mit Reis und Fleisch ein ähnlicher Harnquotientenwert vergesellschaftet ist, müßten auch diese beiden Substanzen, vorausgesetzt die Allgemeingültigkeit der genannten Beobachtungen, als Nahrungs-N-Träger in der gemischten Nahrung einen ähnlichen Leberglykogengehalt bewirken, und es hätte dann nicht, wie es in den Versuchen Atabays der Fall war, ein umfänglicher Ersatz des Reis-N durch Fleisch-N in der Nahrung zu einer Erniedrigung des Leberglykogengehaltes führen dürfen. Allerdings war bei den Atabayfchen Versuchen zur Gleichstellung des Kaloriengehaltes der zu vergleichenden Diäten das in der Reis-Hammelfleisch-Diät im Vergleich zur Reisdiet fehlende Reiskohlehydrat durch Rohrzucker ersetzt worden. Zur Klärung der aufgeworfenen Frage stellte ich meine Versuche an, deren Ergebnis war, daß bei der Reismahrung der Leberglykogengehalt um 25 % höher war als bei der korrespondierenden Caseinnahrung.

Es war damit verständlich geworden, daß bei den Atabayfchen Versuchen bei anfänglichem partiellen Ersatz des Reises durch Hammelfleisch der Leberglykogengehalt sinken konnte. Es war nur noch die Frage unentschieden, ob für den erhöhten Leberglykogenwert bei der Reismahrung der Reis-N oder das Kohlehydrat des Reises, nämlich die Reisstärke, verantwortlich zu machen sei. Bei den Atabayfchen Versuchen bestand bei Berechnung auf je 5 als Versuchstiere dienende weiße Ratten die tägliche Ration der Reismahrung aus:

54,0 g	Reis	0,56 g N	185 Kalorien
10,5 ccm	Lebertran	—	64 Kalorien
12,5 g	Rübenzucker	—	51 Kalorien
2,0 g	Salzgemisch	—	—
5,0 ccm	Zitronensaft	—	—
300,0 ccm	Wasser	—	—

0,56 g N

300 Kalorien

Der Leberglykogengehalt betrug 1,597% (Glykogenraubenzucker).

Die tägliche Ration der Reis-Hammelfleisch-Nahrung hatte für 5 Ratten folgende Zusammenfassung:

15,0 g	frisches Hammelfl.	0,41 g N	48 Kalorien
13,0 g	Reis	0,14 g N	45 Kalorien
7,5 ccm	Lebertran	—	64 Kalorien
42,5 g	Rübenzucker	—	174 Kalorien
2,0 g	Salzgemisch	—	—
5,0 ccm	Zitronensaft	—	—
300,0 ccm	Wasser	—	—

0,55 g N 331 Kalorien

Der Leberglykogengehalt betrug 1,095% (Glykogentraubenzucker).

Es war also bei den Atabayfchen Versuchen gewiß bei der Reisdiet im Vergleich zur Fleisch-Reis-Diet ein etwa 46% höherer Leberglykogengehalt nachweisbar, aber es war, wie schon gesagt wurde, in der Fleisch-Reis-Diet ein großer Teil der in der Reisdiet enthaltenen Reistärke durch Rübenzucker ersetzt worden, um den Kalorien- und Kohlehydratgehalt in beiden Diäten möglichst gleich zu machen. Man hatte bei der Anstellung der Versuche nicht daran gedacht, auch in der Hammelfleisch-Reis-Diet den Kohlehydratgehalt bis auf 12,5 g Zucker, die auch in der Reisdiet vorhanden waren, durch Reistärke herzustellen. Wie die Versuche nun einmal angeordnet waren, konnte der höhere Leberglykogengehalt bei der Reisdiet auch mit dem Kohlehydrat zusammenhängen, wenn nämlich Reistärke besser glykogenisiert wurde als Rohrzucker. Wir wissen nämlich, daß unterschiedliche Zucker- und Stärkearten eine unterschiedliche Eignung haben, in Glykogen umgewandelt und als solches in der Leber deponiert zu werden.

Eine Arbeit von Pierce (5) zeigt das unter Berücksichtigung der zu dieser Frage vorliegenden Literatur in sehr anschaulicher Weise. Danach gehört Rohrzucker allerdings zu den besten Glykogenbildnern; Kartoffelstärke teilt mit ihm diese Eigenschaft. Wie sich im Vergleich zum Rohrzucker in dieser Hinsicht die Reistärke verhält, ist jedoch unbekannt. Wohl aber wissen wir aus den Versuchen von Danopoulos (6), daß im Vergleich zur Weizen-, Kartoffel- und Maisstärke die Reistärke bei im übrigen in jeder Hinsicht gleichen Diäten etwa 20% mehr Glykogen in der Leber zur Ablagerung bringt, als die anderen genannten Stärkearten. Bei diesen Versuchen, die an vier Gruppen

von je 15 männlichen weißen Ratten mit einem Durchschnittsgewicht von je 185 g gemacht wurden, waren die Nahrungsmischungen bis auf die Qualität der Stärke völlig gleich. Das Nahrungseiweiß war in diesen Fällen Casein. Ich führe nachstehend die Versuchsergebnisse aus der Arbeit von Danopoulos in einer Übersichtstabelle an.

Übersichtstabelle

Nahrung für je 15 Ratten im Gesamtgewicht von etwa 2800 g: Casein 15 g, Lebertran 37,5 ccm, Mac Culm'sches Salzgemisch Nr. 185 = 3 g, frischer Zitronensaft 15 ccm, Wasser 900 ccm, Stärke 105 g.

Stärkeart	Zahl der Tiere	Dauer der Fütterung in Tagen	%-Gehalt d. frischen Lebern an Glyko- gentraubenzucker
Kartoffel	5	12	0,678
Kartoffel	5	14	0,692
Kartoffel	5	16	0,700
Weizen	5	12	0,653
Weizen	5	14	0,686
Weizen	5	16	0,697
Mais	5	12	0,678
Mais	5	14	0,692
Mais	5	16	0,698
Reis	5	12	0,800
Reis	5	14	0,834
Reis	5	16	0,840

Es bleibt einer künftigen Untersuchung vorbehalten, ob bei zwei Diäten, die bis auf den Nahrungs-N-Träger in jeder Hinsicht völlig gleich zusammengesetzt sind, die alle beide als Kohlehydrat Reisstärke in gleichen Mengen enthalten und von denen die eine als Nahrungs-N-Träger Reiseiweiß, die andere in N-aequimolikularer Menge aber Casein besitzt, die Reiseiweißdiät denselben oder einen höheren Leberglykogengehalt bewirkt, wie die Caseindiät. Erst durch eine solche Untersuchung kann in definitiver Weise entschieden werden, ob an dem höheren Glykogengehalt der Leber bei der Reismahrung lediglich das Kohlehydrat im Reis oder daneben auch das Reiseiweiß beteiligt ist.

Meine eigenen Versuche haben lediglich den Nachweis erbracht, daß im Vergleich zu einer Caseindiät mit Rohrzucker und Kartoffelstärke zu gleichen Teilen, also mit zwei nach Pierce vorzüglichen Glykogenbildnern, eine Reisdiät, deren Kohlehydrat lediglich die Reisstärke, und deren Eiweiß lediglich das Reiseiweiß war, einen zweifellos höheren Glykogengehalt der Leber unterhält.

Andererseits haben die Versuche von Kohler dargetan, daß zwei derartige Diäten von der Zusammenfassung, wie sie eben geschildert wurden, gleiche Harnquotienten unterhalten, daß also hinsichtlich der Regulation der Oxydationslage im Zwischenstoffwechsel zwischen Casein und Reiseiweiß kein Unterschied besteht. Denn es gibt keinen Anhaltspunkt für die Annahme — darüber existiert eine umfangreiche Literatur, an der u. a. auch Rubner beteiligt ist — daß Rohrzucker oder unterschiedliche Stärkearten unter im übrigen gleichen Diätverhältnissen unterschiedlichen Einfluß auf die Harnquotienten C:N und VO:N haben. Wenn jedoch die in den einzelnen Diäten jeweils vorhandenen Nahrungseiweißarten, im vorliegenden Falle also Casein und Reiseiweiß, gleiche Wirkungen auf die Harnquotienten ausüben, so könnte dennoch die Wirkung auf das Leberglykogen verschieden sein. Bei dem reichen Kohlehydrat- und Fettgehalt bei relativ geringem Eiweißgehalt aller bei diesen Versuchen verwandten Diäten kann das verfütterte Eiweiß kaum im Sinne einer mehr oder minder guten Bausteinbelieferung des Körpers für Glykogen in Frage kommen, sondern es vermöchte nur beim Zustandekommen der beobachteten Wirkungen auf den Leberglykogengehalt im Sinne steuernder Wirkung aus dem Kohlehydrat- und Fettbestand der Nahrung eine mehr oder minder große Glykogenmenge in der Leber zur Ablagerung zu bringen.

Ich wende mich nun der Schilderung meiner eigenen Versuche zu. Wie aus den Nahrungsmitteltabellen hervorgeht, enthielt die Reisdiät in meinen Versuchsnahrungen pro Tier und Tag 0,027 g N mehr als die Caseindiät. Nach Maßgabe der Beobachtungen von Pirl (7) an Caseindiäten hätte der höhere N-Gehalt eher erniedrigend auf den Leberglykogengehalt wirken können als erhöhend, wenn die Qualität des Eiweißes in beiden Fällen dieselbe gewesen wäre. Die Caseindiät enthielt dagegen pro Tier und Tag 2 Kalorien mehr als die Reisdiät. Die bessere kalorische Verforgung hätte eher begünstigend auf den Leberglykogengehalt wirken können als die ein wenig knappere kalorische Verforgung des Körpers bei der Reisdiät. Da in beiden Fällen

aber das Ergebnis des Versuches umgekehrt war, als diese Hinweise vermuten ließen, können also diese kleinen Differenzen in der täglichen N- und Kalorienmenge bei beiden Diäten keinen Einfluß auf den Leberglykogengehalt gehabt haben.

Aus meinen Versuchen ergibt sich vielmehr, daß der Leberglykogengehalt bei der Reismahrung etwa 25 bis 26 % höher war, als es bei der Caseinnahrung der Fall war. Aus den oben erwähnten Versuchen von Danopoulos geht aber nun hervor, daß die Reistärke im Gegensatz zu andern Stärkearten und speziell der Kartoffelstärke eine um 20 % bessere Glykogenverförgung der Leber gewährt. Das ist aber fast der Betrag, den ich in meinen Versuchen als bessere Glykogenverförgung bei der Reismahrung gefunden habe. Man könnte also den Schluß ziehen, daß das Ergebnis bei meinen Versuchen überhaupt nichts mit der Beschaffenheit des Reiseiweißes, sondern nur etwas mit der Beschaffenheit der Reistärke zu tun hätte. Da aber Vergleichsversuche zwischen Rohrzucker und Reistärke hinsichtlich der glykogenisierenden Wirkung fehlen und bei meinen Experimenten in der Caseindiät die hier fehlende Reistärke zum Teil durch Rohrzucker ersetzt war, ist ein solcher Schluß eben doch nur mit Vorbehalt möglich.

Experimenteller Teil.

Die Nahrung wurde so zubereitet, daß man aus ihr mit Ausnahme der Vitaminträger Lebertran und Zitronensaft einen Brei kochte, dem nach Beendigung des Kochens die Vitaminträger untermischt wurden. Die Ratten fraßen die täglichen Futterrationen restlos auf. Das Körpergewicht blieb bei allen Gruppen konstant. Ratten jeder Gruppe wurden nach 14- und 15tägiger Fütterung durch Genickschlag getötet. Die Fütterung der Tiere fand täglich zwischen 11 und 12 Uhr statt. Die Tiere wurden in Käfigen zu Gruppen von je 10 gehalten. Die Käfige standen nebeneinander im gleichen Zimmer, so daß die äußeren Verhältnisse für alle Tiere gleich waren. Die Tiere entstammten einem Tiervorrat, der längere Zeit vorher unter gleichen Ernährungsverhältnissen und sonstigen äußeren Bedingungen gehalten war. Der Futterverzehr fand vorzüglich während der Abendstunden statt. Am folgenden frühen Morgen waren die Futternäpfe immer leer. Die Tötung,

die, wie ich schon oben angeführt habe, durch Genickschlag vorgenommen wurde, fand immer zwischen 9 und 9.30 Uhr statt. Es wurden immer 5 Tiere rasch hintereinander getötet, die Lebern schnellstens aus den Körpern genommen, mit einigen Scherenschnitten zerteilt und in ein vorher gewogenes Gefäß mit heißer Kalilauge geworfen und dann darin gewogen. Das Gewicht jeder Gruppe von 5 Tieren wurde laufend gewogen. Es schwankte im Mittel von jeder Gruppe zwischen 238 und 249 g. Alle Gruppen zeigten während der Versuchsdauer eine geringe Gewichtszunahme, die bei 5 Tieren 5—10 g im Verlauf von 14 Tagen betrug. 10 Tiere jeder Ernährungsart wurden nach 14tägiger Fütterung, die anderen 10 Ratten nach 15tägiger Fütterung getötet. Im ganzen wurden die Lebern von 20 Ratten mit Caseinnahrung und 20 Ratten mit Reishahrung untersucht.

Versuchsprotokolle.

Tägliche Futtermenge für 10 Ratten.

Es enthalten:

1 g Casein	= 0,125 g N
1 g Reis	= 0,0121 g N
1 g Stärke	= 0,0008 g N

Caseinnahrung.

Casein	10,0 g
Lebertran	15,0 ccm
Zucker	60,0 g
Kartoffelstärke	60,0 g
Salzgemisch	2,0 g
Apfelsinenfaß	10,0 ccm
Wasser	600,0 ccm
ca. 62 Kalorien pro Tier und Tag.	

N-Gehalt der Nahrung = 1,30 g (für 10 Ratten pro Tag).

2mal 5 Tiere nach 14 Tagen getötet.

Gewichte	5 Tiere	5 Tiere
1. Tag	1210 g	1220 g
2. Tag	1210 g	1220 g
5. Tag	1210 g	1220 g
8. Tag	1215 g	1225 g
11. Tag	1215 g	1225 g
14. Tag	1215 g	1225 g
Gewicht der Lebern von je 5 Ratten	43,0 g	43,5 g
Glykogentraubenzuckergehalt	1,310%	1,337%

2mal 5 Tiere nach 15 Tagen getötet.

Gewichte	5 Tiere	5 Tiere
1. Tag	1235 g	1230 g
2. Tag	1235 g	1230 g
5. Tag	1235 g	1235 g
8. Tag	1240 g	1235 g
11. Tag	1240 g	1240 g
13. Tag	1240 g	1240 g
15. Tag	1245 g	1240 g
Gewicht der Lebern von je 5 Ratten	49,5 g	48,7 g
Glykogentraubenzuckergehalt	1,369%	1,329%

Reisnahrung.

Reis	130,0 g
Lebertran	15,0 ccm
Salzgemisch	2,0 g
Apfelsinenfaß	10,0 ccm
Wasser	600,0 ccm

ca. 60 Kalorien pro Tier und Tag.

N-Gehalt der Nahrung = 1,57 g (für 10 Ratten pro Tag).

2mal 5 Tiere nach 14 Tagen getötet.

Gewichte	5 Tiere	5 Tiere
1. Tag	1245 g	1230 g
2. Tag	1245 g	1230 g
5. Tag	1245 g	1235 g
8. Tag	1250 g	1235 g
11. Tag	1250 g	1235 g
14. Tag	1250 g	1235 g
Gewicht der Lebern von je 5 Ratten	48,5 g	47,8 g
Glykogentraubenzuckergehalt	1,775 %	1,659 %

2mal 5 Tiere nach 15 Tagen getötet.

Gewichte	5 Tiere	5 Tiere
1. Tag	1190 g	1195 g
2. Tag	1190 g	1195 g
5. Tag	1195 g	1195 g
8. Tag	1195 g	1200 g
11. Tag	1195 g	1200 g
13. Tag	1195 g	1200 g
15. Tag	1195 g	1205 g
Gewicht der Lebern von je 5 Ratten	45,4 g	46,0 g
Glykogentraubenzuckergehalt	1,634 %	1,658 %

Mittelwerte bei Cafeinnahrung: 1,336 %.

Mittelwerte bei Reissnahrung: 1,681 %.

Bei der Reissnahrung enthielt die Leber also 25,9 % mehr Glykogen als bei der Cafeinnahrung.

Ergebnis.

Vergleichende Fütterungsversuche an Ratten ergaben, daß eine Diät, in der statt Cafein Reisseiweiß der Nahrungs-N-Träger und anstatt Rohrzucker und Kartoffelstärke zu gleichen Teilen Reiskeime

das Kohlehydrat ist, bei sonst gleicher Beschaffenheit einen 25 bis 26 % höheren Glykogenbestand der Leber unterhält, als es bei der Caseindiät der Fall ist.

Wie weit an diesem Unterschied die qualitative Verschiedenartigkeit des Eiweißes und wie weit die qualitative Verschiedenartigkeit des Kohlehydrats in beiden Diäten beteiligt ist, bleibt vorläufig dahingestellt.

Literatur.

1. *A. Bickel* über die Beziehungen der Qualität des Nahrungseiweißes zum Ablauf des Betriebsstoffwechsels.
Verlag B. Schwabe & Cie. Basel 1938.
2. *Hadi Atabay*: Methodologische Untersuchungen zur Lehre von dem Einfluß der Qualität des Nahrungseiweißes auf den Ablauf des Zwischenstoffwechsels.
Diss. Berlin Med. Fac. 1938.
3. *Kading*: Zeitschrift für Untersuchung für Lebensmittel.
4. *Kohler*: Beobachtungen über den Einfluß des Reiseiweißes auf den Stoffwechsel. Diss. Med. Fac. 1938.
5. *Pierce*: The Journal of Nutrition. Vol. 10. Nr. 6, 1935.
6. *Danopoulos*: Glykogengehalt der Leber bei Ernährung mit unterschiedlichen Stärkearten in der gemischten Nahrung.
Seite 100 bis 103 Biochemische Zeitschrift 1938, 299. Band.
7. *Pirl*: Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß unterschiedlicher Mengen des gleichen Eiweißes (Casein) in der gemischten Nahrung auf den Glykogengehalt der Leber und die Oxydationslage im Zwischenstoffwechsel.

Lebenslauf.

Am 27. 10. 1911 bin ich in Altdamm (Pommern) als Sohn des Kaufmanns Wilhelm Repnow und seiner Ehefrau Frieda geb. Zabel geboren.

Meine Schulzeit begann auf der Grundschule in Sydowsaue bei Stettin. Daran anschließend ging ich in die Mittelschule nach Altdamm und von 1921 an zur Friedrich-Wilhelms-Schule in Stettin bis zur Reifeprüfung Ostern 1932. Mein Medizinstudium begann ich im Sommersemester 1932 in Berlin. Die ärztliche Vorprüfung bestand ich nach 5 Semestern in Jena. Danach folgte mein Eintritt in die Wehrmacht zur Ableistung eines freiwilligen Dienstjahres. Im Anschluß daran wurde ich als Sanitätsoffiziersanwärter übernommen und legte am 30. Juli 1938, nachdem ich in Königsberg, München und Berlin die klinischen Semester gehört hatte, in Berlin die ärztliche Prüfung ab.

Am Standortlazarett Iferlohn leistete ich das praktische Jahr ab. Anschließend nahm ich als Adjutant eines Divisionsarztes bei einer Panzer-Division an den Feldzügen in Polen und Frankreich teil.

Franz Repnow.

